

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

ОЛАЗОЛЬ®

наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Олазол®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Бензокаин + Борная кислота + Облепихи крушиновидной плодов масло + Хлорамфеникол

Лекарственная форма: аэрозоль для наружного применения

Состав на один баллон:

60 г

80 г

Действующие вещества:

Облепиховое масло	5,40 г	или	7,20 г
Хлорамфеникол	1,62 г	или	2,16 г
Бензокаин(анестезин)	1,62 г	или	2,16 г
Борная кислота	0,27 г	или	0,36 г

Вспомогательные вещества:

Троламин	1,62 г	или	2,16 г
Ланолин безводный	0,27 г	или	0,36 г
Стеариновая кислота	2,16 г	или	2,88 г
Глицерол (глицерин)	5,40 г	или	7,20 г
Вода очищенная	35,64 г	или	47,52 г
Смесь хладонов 22 и 142В (дифторхлорметан + дифторхлорэтан)	6,00 г	или	8,00 г

Описание: препарат при выходе из баллона образует пену желтого или желтого со слегка оранжевым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство комбинированное.

Код АТХ: D08AX

Фармакологические свойства:

Ранозаживляющее средство. Оказывает анестезирующее и антибактериальное действие, уменьшает экссудацию, способствует регенерации тканей и ускоряет процесс эпителизации ран.

Показания к применению:

Инфицированные раны (в т.ч. вялозаживающие раны), трофические язвы, ожоги, свободная кожная пластика, микробная экзема, зудящий дерматит.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Беременность, период грудного вскармливания, период новорожденности.

С осторожностью:

Ранний детский возраст.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы:

Наружно. Раневую поверхность по возможности очищают от гноя, некротических тканей и покрывают равномерным слоем пены ежедневно или через день, а при открытом лечении ран и ожогов - 1-4 раза в сутки, в зависимости от характера воспаления и стадии регенерации поврежденных тканей. Курс лечения определяется индивидуально лечащим врачом.

Для получения равномерного слоя пены баллон необходимо встряхнуть (10-15 раз). Пену наносят до покрытия всей раневой поверхности, с расстояния 1-5 см.

Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие:

Аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

Сведения о передозировке препаратом отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

В период лечения возможно использование системной антибактериальной терапии.

Возможность и необходимость применения с другими наружными лекарственными средствами определяется индивидуально лечащим врачом в зависимости от характера воспаления и стадии регенерации поврежденных тканей.

При одновременном применении с эритромицином, клиндамицином, линкомицином возможно взаимное ослабление действия за счет того, что хлорамфеникол может вытеснять эти препараты из связанного состояния или препятствовать их связыванию с 50S субъединицей бактериальных рибосом. Хлорамфеникол снижает антибактериальный эффект пенициллинов, цефалоспоринов.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Олазол[®] проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания:

Не допускать попадания в глаза.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Не влияет на способность управлять автотранспортом или работу с другими потенциально-опасными механизмами.

Форма выпуска:

Аэрозоль для наружного применения.

По 60 г или 80 г в баллоны аэрозольные алюминиевые, снабженные клапаном непрерывного действия, распылительной насадкой и предохранительным колпачком. Каждый баллон помещают в пачку из картона. Текст инструкции по применению наносят на пачку.

Условия хранения:

При температуре не выше 15 °С, вдали от источников огня, отопительных приборов и прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Отпускают без рецепта.

Владелец РУ/предприятие-производитель/организация, принимающая претензии по качеству:

ЗАО «Алтайвитамины»

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

тел: (3854) (3854) 338-719, 326-948,

факс: (3854) (3854) 326-943.

Генеральный директор

ЗАО «Алтайвитамины»

Ю.А.Кошелев